

# Thuốc tránh thai khẩn cấp là gì

## Thuốc tránh thai khẩn cấp là gì

Thuốc kháng sinh phòng tránh thai cấp bách là cách phòng tránh thai đạt hiệu quả lên đến 90% trong tầm 120 giờ (5 ngày) hoặc 72 giờ (3 ngày) tùy loại kháng sinh dưới khi nảy sinh "yêu" tình dục không an toàn. Tuy nhiên, chị em chỉ cần uống thuốc ngừa thai trong giới hạn chấp nhận, Nếu như lạm dụng quá nhiều có nguy cơ thấy phản ứng phụ Cùng rất nhiều hệ lụy tính mạng.

Bài văn sau đây được giải đáp tay nghề bởi ThS.BS Trần Thị Thanh Thảo, bác sĩ Trung tâm phụ khoa cơ sở y tế Tâm Anh TP.HCM sẽ chia sẻ một số hiểu biết cụ thể về *Thuốc ngừa thai cấp bách*, giải pháp dùng thuốc hợp lý Nhằm hạn chế những tác dụng phụ đe dọa đến sức khỏe cùng với chức năng có con của phụ nữ.

## Thuốc kháng sinh ngừa thai cấp tốc là gì?

Kháng sinh ngừa thai cấp tốc (Emergency Contraceptive Pills) là giải pháp phòng tránh thai được dùng sau lúc nảy sinh "yêu" tình dục không sử dụng bao cao su như "làm chuyện ấy" tình dục không được bảo vệ, phái đẹp mắc cưỡng hiếp hay thì có lấy phương pháp bảo vệ khác nhưng hoang mang không thành công. (1)

Thành phần hàng đầu của thuốc kháng sinh phòng tránh thai cấp bách đựng hàm lượng không nhỏ hormone sinh dục phái đẹp Progesterone. Quy tắc ngừa thai tương tự như thuốc phòng tránh thai hàng ngày, song quá trình khác biệt hàm số lượng Progestin chính là điểm khác biệt, giúp cho kiểu thuốc này chẩn đoán công dụng ngừa thai mau chóng.

ThS.BS Trần Thị Thanh Thảo, chuyên gia Trung tâm phụ khoa bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho thấy, thuốc ngừa thai cấp bách là biện pháp hữu hiệu kết luận các tình huống "cấp bách" - có thể có bầu dưới khi nảy sinh "làm chuyện ấy" tình dục không sử dụng bao cao su. Có 3 nhóm đối tượng dùng thuốc thường bắt gặp nhất là:

- Nhóm thứ nhất: cơ thể không thường xuyên "làm chuyện ấy" tình dục, người chưa có hoặc không thể dùng một số phương pháp phòng ngừa mang bầu phía ngoài ý muốn như uống thuốc phòng tránh thai hàng ngày, đặt tẩm phòng tránh thai, sử dụng lát dán phòng tránh

thai hay không có sẵn bao lớn su...

- Nhóm thứ hai: cơ thể bị hiệp dâm hoặc cưỡng bức tiếp diễn vấn đề giao hợp tình dục nên không muốn có thai.
- Nhóm thứ ba: cơ thể đã từng sử dụng những biện pháp ngừa thai khác tuy vậy hoang mang thất bại, ví như quên dùng thuốc kháng sinh tránh thai hàng ngày, lấy thuốc kháng sinh tiêm ngừa thai song thời điểm tiêm bị chậm so với chu kỳ quy chuẩn, bao lớn su mắc thủng hay bị rách...

Tìm hiểu cho thấy, kháng sinh phòng tránh thai cấp bách đạt hiệu quả tránh thai lên tới 90% trong tầm một ngày trước hết sau lúc nảy sinh "yêu" tình dục không sử dụng bao cao su. Nếu lấy càng muộn sau lúc "âm trậ" hiệu quả tránh thai càng rẻ hơn. Tùy loại thuốc kháng sinh mà hiệu quả ngừa thai sẽ mất đi Nếu như vượt quá khoảng thời gian kết luận phép: 120 giờ (5 ngày) hoặc 72 giờ (3 ngày). (2)

- [trasparenza.provincia.caserta.it:81/web/suckhoe24gio/home/-/blogs/phong-kham-da-khoa-thai-ha](http://trasparenza.provincia.caserta.it:81/web/suckhoe24gio/home/-/blogs/phong-kham-da-khoa-thai-ha)
- [chất lượng phòng khám đa khoa thái hà phòng khám uy tín tại hà nội bệnh viện nam khoa hà nội khám yếu sinh lý ở đâu tốt nhất chữa bệnh xuất tinh sớm ở đâu tốt nhất cắt bao quy đầu bệnh viện bình dân chi phí cắt bao quy đầu dài chữa bệnh trĩ ở đâu tốt mổ trĩ hết bao nhiêu tiền phòng khám phụ khoa hà nội khám phụ khoa giá bao nhiêu phá thai an toàn chi phí phá thai phá thai tại hà nội khám chữa bệnh sùi mào gà ở đâu chữa bệnh sùi mào gà hết bao nhiêu tiền cắt tuyến mô hôi nách ở đâu đa khoa thái hà phòng khám đa khoa tốt nhất hà nội bệnh viện nam học bệnh viện chữa yếu sinh lý chữa bệnh xuất tinh sớm ở đâu cắt bao quy đầu ở đâu tốt nhất chi phí cắt dây hãm bao quy đầu khám bệnh trĩ phẫu thuật bệnh trĩ hết bao nhiêu tiền khám phụ khoa ở đâu tốt nhất hà nội khám phụ khoa bao nhiêu tiền phá thai chi phí phá thai bằng thuốc địa chỉ phá thai an toàn chữa bệnh sùi mào gà ở đâu tốt Điều trị sùi mào gà có tốn kém không khám bệnh lậu xét nghiệm bệnh giang mai ở đâu chữa hôi nách ở đâu tốt](#)

## **Cơ chế vận động của thuốc phòng tránh thai cấp tốc**

Khi được đưa vào cơ thể, một số đối tượng nội đào thải có trong kháng sinh phòng tránh thai cấp tốc sẽ dẫn đến chi phối, gây cản trở quá trình rụng trứng thiên nhiên tại phụ nữ, nhờ đó ngăn cản quá trình gặp gỡ cùng

với xảy ra thụ thai giữa trứng và tinh binh.

Trong trường hợp trứng đã thụ thai, thuốc kháng sinh sẽ ngăn không cho nội mạc tử cung tạo thành cửa sổ làm tổ, cản trở vấn đề gây tổ của phôi thai trong lòng tử cung. Nếu việc khiến cho tổ đã từng diễn ra, kháng sinh tránh thai cấp tốc không gây đứt đoạn việc mang thai.

Bác sĩ chuyên khoa Thanh Thảo nhấn mạnh, cần phân biệt rõ ràng thuốc tránh thai cấp tốc và thuốc bỏ thai. Thuốc phòng tránh thai khẩn cấp KHÔNG cần phải là thuốc bỏ thai. Cơ chế hoạt động của thuốc kháng sinh tránh thai cấp bách chính là trở ngại không chẩn đoán tinh trùng gặp trứng bằng biện pháp ngăn cản việc trứng rụng. Có nghĩa là thuốc tránh thai cấp tốc chỉ trở ngại vấn đề có con, không cần phải kết thúc việc mang bầu.

## **Những loại kháng sinh phòng tránh thai cấp tốc thường thấy Thực tế hiện nay**

Bác sĩ chuyên khoa Thanh Thảo cho thấy, thuốc tránh thai khẩn cấp Tăng cường hiệu quả tránh thai tối đa Nếu dùng Tức thì dưới khi nảy sinh "yêu" không sử dụng bao cao su. Thực tế hiện nay, Trên thị trường thì có không ít kiểu thuốc, thường bắt gặp nhất là loại 72 giờ cũng như 120 giờ, ít thường gặp hơn là các dạng 24 giờ, 36 giờ hay 48 giờ. (3)

Một số dạng thuốc kháng sinh tránh thai cấp bách được phân dạng thành loại một viên hoặc kiểu 2 viên, Bởi vì thể biện pháp dùng cũng khác biệt nhau.

### **Thuốc kháng sinh ngừa thai cấp tốc dạng 1 viên**

Thuốc kháng sinh phòng tránh thai cấp bách dạng một viên được nhiều người chọn bởi vì độ thường bắt gặp Trên thị trường cùng với đặc điểm thuận tiện lúc sử dụng. Hầu hết các viên thuốc dạng này chỉ đạt hiệu quả phòng chống việc mang thai ngoài mong muốn Nếu sử dụng trong vòng 72 giờ (3 ngày) sau lúc phát sinh quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su.

Theo tìm hiểu, thời gian dùng kháng sinh càng kịp thời thì hữu hiệu phòng tránh thai càng cao. Rõ ràng là:

- Sử dụng thuốc trong khoảng một ngày đầu tiên: hiệu quả tránh thai là 90%;

- Khoảng 25-48 giờ tiếp theo: hữu hiệu ngừa thai là 85%;
- Khoảng 49-72 giờ tiếp theo: hiệu quả tránh thai là 58%;
- Vượt quá 72 giờ: Nếu trứng cùng với tinh trùng từng thụ thai và khiến tổ trong dạ con, thuốc không còn công dụng bảo vệ.

Một số nhãn hiệu thuốc kháng sinh ngừa thai loại một viên đang hay bắt gặp Vừa rồi thị trường gồm:

- Postinor-1®: liệu có đối tượng Levonorgestrel hàm lượng một,5mg, liều lấy một viên duy nhất.
- Mifestad 10®: đối tượng đựng Mifepristone (chất đối kháng Progestin) hàm lượng 10mg đạt hiệu quả phòng tránh thai an toàn.
- Bocinor®: thành phần Levonorgestrel hàm lượng một,5mg đóng gói kiểu 1 viên nén/1 vỉ.
- Lys®: chứa Levonorgestrel hàm lượng 0,75mg, thường hay sử dụng cho biết trường hợp không "âm trặn" hàng ngày hoặc thì có "làm chuyện ấy" tình dục đột phóng.
- Ciel EC 25®: thích hợp cho biết tình huống quan hệ tình dục lần đầu không dùng phương pháp tránh thai, mắc hiệp dâm hay cưỡng bức "yêu" tình dục.
- Naphamife®: một nhãn hiệu thuốc kháng sinh được sản sinh ở Việt cánh mày râu, thì có đối tượng Mifepristone 10mg Cùng rất nhiều tá dược.

## **Thuốc kháng sinh phòng tránh thai khẩn cấp loại 2 viên**

Thuốc kháng sinh ngừa thai dạng 2 viên ít thường gặp hơn. Quy giải pháp đóng gói 2 viên thuốc/hộp, từng viên đựng 0,75mg Levonorgestrel. Viên thứ nhất sử dụng càng sớm càng tốt sau lúc phát sinh "yêu" không sử dụng bao cao su, không vượt quá 72 giờ. Viên thứ hai uống dưới viên thứ nhất 12 giờ, không Để quá 16 giờ. Kháng sinh chỉ Bổ sung hiệu quả ngừa thai khi người sử dụng uống không thiếu cùng với đúng 2 viên theo khoảng thời gian quy định.

Những nhãn hiệu thuốc phòng tránh thai cấp tốc dạng 2 viên thường gặp Vừa rồi thị trường gồm:

- Postinor-2®: Nhãn hiệu kháng sinh phổ biến nhất, gồm có 2 viên nén đựng thành phần Levonorgestrel hàm số lượng 0,75mg ở từng viên.
- Happynor®: Nhãn hiệu kháng sinh được tạo ra tại Việt phái mạnh, 1 hộp kháng sinh gồm có 2 viên, mỗi viên đựng hàm lượng 0,75mg Levonorgestrel.

- Posinight 2®: đối tượng cũng như cơ chế chi phối tương tự như 2 nhãn hiệu Vừa rồi.

Bác sĩ Thanh Thảo nhấn mạnh, khi sử dụng thuốc phòng tránh thai cấp tốc, cơ thể dùng cần biết rõ mình sử dụng kiểu một viên hay 2 viên Để lấy đúng, hạn chế vấn đề sử dụng sai lệch khiến mất đi hiệu quả phòng tránh thai.

## **Hiệu quả của thuốc kháng sinh phòng tránh thai khẩn cấp dưới khi sử dụng**

Thường thì, chị em không mang bầu Ngay sau lúc có quan hệ tình dục. Tinh trùng sẽ sống sót trong cơ thể người chị em trong khoảng 5 ngày. Tại khoảng thời gian đó, Nếu tiếp diễn hiện tượng rụng trứng, tinh binh thấy trứng cùng với thụ thai sẽ cho hiệu quả mang thai. (4)

Kháng sinh phòng tránh thai cấp bách thì có trách nhiệm trở ngại việc rụng trứng tự nhiên diễn ra, ngăn không cho buồng trứng xuất thích trứng. Chủ yếu Vì thế, Nếu trứng từng rụng, trứng cũng như tinh trùng đã thấy nhau, đã thụ tinh cũng như từng gây tổ trong niêm mạc tử cung thì thuốc kháng sinh không còn tác dụng.

Đó chủ yếu là lý bởi vì tại sao một số bác sĩ y học khuyến cáo chị em cần sử dụng càng sớm càng tốt dưới lúc nảy sinh "lâm trận" tình dục không sử dụng bao cao su Nếu như không muốn có bầu.

Nhưng, nghiên cứu cho thấy khoảng 1-2% tình huống nữ lấy thuốc kháng sinh phòng tránh thai cấp bách vẫn mang thai Cho dù đã uống thuốc kháng sinh trong tầm 72 giờ (3 ngày) dưới lúc phát sinh giao hợp tình dục không được bảo vệ.

Nghĩa là, thuốc tránh thai cấp bách không bảo vệ tuyệt nhiên được tất cả những trường hợp có thai bên ngoài ý muốn. Nếu sau khi sử dụng thuốc phòng tránh thai không xuất hiện xuất hiện "đèn đỏ" vào chu kỳ kinh tiếp, phải đẹp nên thăm khám kịp thời Để được tìm chắc chắn vấn đề có bầu hoặc không.

## **Nên sử dụng kháng sinh phòng tránh thai lúc nào?**

Thuốc tránh thai cấp bách nên sử dụng trong những trường hợp nảy sinh giao hợp tình dục không an toàn mà không muốn mang bầu. Cụ thể là:

- Chưa có hay chưa thể sử dụng cách tránh thai nào.
- Bị hiệp dâm hay cưỡng bức quan hệ tình dục không được bảo vệ.
- lo ngại về khả năng phòng tránh thai bất thành khi lấy cách ngừa thai khác như:
  - Bao cao su rách, thủng, tụt hoặc sử dụng không đúng phương pháp.
  - Quên sử dụng thuốc tránh thai phối hợp Từ 3 viên trở lên hoặc chậm trễ kinh 3 ngày so với chu kỳ bình thường.
  - Trễ 3 giờ so đối với thời điểm uống thuốc hàng ngày chỉ định Progestin.
  - Chậm kinh nguyệt 7 ngày đối với thuốc tránh thai dạng tiêm phối hợp.
  - Lộn vòng ngừa thai hoặc que cấy phòng tránh thai nội đào thất tổ.
  - Rút "cậu nhỏ" bất thành, như phóng tinh truy cập âm hộ hay Trên đây cơ quan sinh sản phía ngoài.
  - Tính toán sai lầm khoảng thời gian kiêng cử.

## **Các phản ứng phụ khi dùng kháng sinh phòng tránh thai cấp tốc**

Bác sĩ Thanh Thảo cho rằng, Cho dù thuốc phòng tránh thai cấp bách đạt hiệu quả phòng tránh thai nhanh chóng cùng với hiệu quả lên đến 90%, tuy nhiên Nếu dùng sai lệch giải pháp hay dùng quá nhiều thuốc có nguy cơ dẫn đến rất nhiều tác dụng phụ, lâu ngày có nguy cơ gây nên không ít hệ lụy trầm trọng chi phối đến tính mệnh người dùng.

Một số tác dụng phụ thường thấy của thuốc kháng sinh ồm:

- Biến đổi những ngày kinh nguyệt nguyệt: Là phản ứng phụ hay bắt gặp nhất, có khả năng xuất hiện Ngay Từ lần đầu tiên dùng thuốc kháng sinh phòng tránh thai hay dưới rất nhiều lần uống. Chị em có nguy cơ xuất hiện "đèn đỏ" tới kịp thời hơn hay muộn hơn so với chu kỳ thông thường. Nếu mà muộn hơn 7 ngày, nữ giới cần sử dụng que thử hay xét nghiệm đối với bác sĩ Nhằm được làm cho các kiểm tra cần thiết, xác định chắc chắn việc có bầu hay không.
- Chảy máu tử cung bất thường: một vài trường hợp nữ giới mắc xuất huyết sau dùng thuốc kháng sinh, Đó là tác dụng phụ sẽ mau chóng

tan biến. Nếu mà sau 2 ngày vẫn mắc xuất huyết, nữ nên xét nghiệm Ngay Nhằm loại trừ khả năng bị bệnh lý nghiêm trọng.

- Hoa mắt, mót nôn, nôn: khoảng tầm 50% trường hợp mắc phải tình trạng này, song chị em không nên hoang mang, dấu hiệu nhận biết sẽ tự biến mất sau 1-2 tuần hay sớm hơn. Nếu mà dưới khoảng thời gian Trên đây triệu chứng không tăng cường, nữ giới cần kiểm tra Để định vị nguyên do tiềm ẩn khác biệt.
- Cảm giác đau bụng dưới: Số ít tình huống mắc phải dấu hiệu nhận biết đau bụng dưới quần quai. Trong tình huống này, phái đẹp cần xét nghiệm sớm Nhằm tìm nguyên nhân chuẩn xác của triệu chứng, loại trừ căn nguyên có bầu phía ngoài dạ con – một biến chứng có nguy cơ mắc phải Nếu như phòng tránh thai thất bại với biện pháp uống thuốc kháng sinh tránh thai khẩn cấp.
- Trường hợp sử dụng nhiều thuốc quá mức làm cho người không dung nạp thuốc kháng sinh có thể khiến cho nữ gặp các tác dụng phụ lâu ngày khác như lo lắng hay trầm cảm, Nâng cao cân không tự chủ, rối loạn huyết áp và hô hấp...

Bác sĩ Thanh Thảo khuyến cáo nữ giới không nên dùng quá nhiều uống kháng sinh tránh thai khẩn cấp, chỉ sử dụng trong trường hợp thật quá trình cấp thiết. Tốt nhất cần vận dụng ý kiến bác sĩ Nhằm được tư vấn, chỉ định cách tránh thai phù hợp và an toàn.

## **Ai có thể sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp?**

Phần lớn nữ Đều có nguy cơ dùng thuốc kháng sinh tránh thai cấp bách, bao gồm các trường hợp không thể sử dụng biện pháp tránh thai nội đạo thải tố như thuốc kháng sinh ngừa thai liên tục hoặc miếng dán phòng tránh thai.

Nhưng, phụ nữ không được dùng thuốc phòng tránh thai cấp bách Nếu dị ứng đối với bất cứ đối tượng nào của thuốc kháng sinh, hay mắc bệnh lý có nguy cơ tương tác với thuốc kháng sinh. Thông báo bệnh tình lý hay dị ứng với bác sĩ, dược sĩ Nhằm được tư vấn dùng liệu có an toàn hay không.

## **Những tình huống chống chỉ định với thuốc tránh thai cấp tốc**

Chuyên gia Thanh Thảo nhấn mạnh, những trường hợp dưới đây không nên sử dụng kháng sinh ngừa thai cấp tốc, bao gồm:

- Phái đẹp đang mang bầu hoặc nghi ngờ mang thai;
- Nữ thấy hiện tượng chảy máu âm hộ thất thường mà không Cụ thể nguyên nhân;
- Phái đẹp liệu có tiền sử bệnh nhiễm tắc tĩnh mạch hay bệnh huyết khối.

Các tình huống nên thận trọng lúc uống thuốc phòng tránh thai, tốt hơn hết nên thông báo với bác sĩ chuyên khoa hoặc dược sĩ Nhằm được tư vấn kỹ càng, gồm:

- Chị em bị bệnh bệnh đái đường thì có biến chứng;
- Chị em liệu có tiền sử rối loạn tuần hoàn máu não;
- Chị em bị bệnh tim mạch, bệnh động kinh...

## **Những lưu ý khi dùng kháng sinh phòng tránh thai cấp bách**

Kháng sinh ngừa thai khẩn cấp thì có hai mặt lợi và hại cụ thể, Do đó nữ giới cần phải trang mắc cho biết chính mình một số hiểu biết về biện pháp dùng Nhằm bảo vệ tính mệnh bản thân. Bài viết này là những chú ý lúc sử dụng thuốc kháng sinh chị em nên biết:

- Chỉ dùng thuốc trong tình huống thực sự cần thiết. Đọc kỹ càng chỉ dẫn sử dụng hay tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa, dược sĩ trước lúc sử dụng. Không dùng quá 2 lần/tháng cùng với 3 lần/năm Để không nên nguy hiểm đến chức năng có con của chị em.
- Nên sử dụng thuốc sớm nhất sau lúc phát sinh quan hệ tình dục không được bảo vệ Nhằm đạt kết quả phòng tránh thai lớn nhất.
- Sử dụng rất nhiều viên kháng sinh phòng tránh thai cấp bách không khiến cho Nâng cao hữu hiệu tránh thai, Bên cạnh đó Nâng cao nguy cơ thấy tác dụng phụ trầm trọng bởi cơ thể không hấp thụ kháng sinh. Bởi vậy, phụ nữ chỉ nên dùng đầy đủ cùng với đúng theo khuyến rằg.
- Không sử dụng thuốc trong các trường hợp đang mang bầu hay nghi ngờ mang thai, đang chữa căn bệnh như đái đường, tim mạch, động kinh, mất cân bằng lưu thông máu não...
- Trong tình huống thấy tác dụng phụ dưới uống kháng sinh, Nếu mà những biểu hiện lâu ngày đối với tần suất bất thường, chị em cần phải xét nghiệm Tức thì Để dạng trừ những tình huống bệnh lý nặng.

## **Một số câu hỏi thường thấy**



## **Một. Uống thuốc ngừa thai cấp tốc thì có mang thai không?**

Không có một phương pháp ngừa thai nào cho kết quả tránh thai 100%. Nghiên cứu cho biết, khoảng 1-2% tình huống vẫn mang thai Cho dù sử dụng thuốc ngừa thai Ngay dưới khi quan hệ tình dục không an toàn.

Bởi vì thế, sau lúc sử dụng thuốc kháng sinh, Nếu có cảm giác hành kinh đến trễ hơn 7 ngày so đối với vòng kinh thường thì, chị em phụ nữ nên lấy que thử thai hoặc thăm khám với bác sĩ Để được làm một số thăm khám cấp thiết, định vị chắc chắn liệu có mang thai hoặc không.

## **2. Sử dụng kháng sinh ngừa thai cấp bách thì có tác động khả năng mang thai về sau không?**

Cơ chế vận động của kháng sinh là cản trở việc trứng rụng tự nhiên, không làm gián đoạn quá trình tiến triển của phôi thai trong trường hợp trứng đã từng thụ thai và gây tổ trong niêm mạc dạ con. Chính Bởi vì thế, thuốc kháng sinh phòng tránh thai cấp tốc không khiến chi phối đến chức năng có thai của chị em về sau.

## **3. Làm gì Nhằm biết thuốc kháng sinh phòng tránh thai khẩn cấp liệu có hữu hiệu hay không?**

Dưới lúc dùng thuốc kháng sinh, Nếu thấy hành kinh vẫn thấy như một số chu kỳ thông thường, Cụ thể là triệu chứng phòng tránh thai thành quả. Nhưng mà, Để liệu có kết quả chắc hẳn, phái đẹp cần phải chờ ít nhất một vài tuần, Rồi dùng que thử Để kiểm chứng phòng tránh thai thành công hoặc không.

## **4. Thì có nên dùng không ít viên thuốc kháng sinh ngừa thai cấp bách Nhằm Tăng hữu hiệu ngừa thai không?**

Lời giải đáp là không. Dùng rất nhiều viên Cùng với lúc không làm cho Tăng hiệu quả tránh thai, Mặt khác còn làm Tăng nguy cơ thấy rất nhiều tác dụng phụ trầm trọng do người chưa thể hấp thu. Nhiều tình huống dùng quá nhiều thuốc có nguy cơ xuất hiện biểu hiện khó chịu tại dạ dày. Khuyến cáo chỉ cần dùng tối đa 2 viên/tháng hoặc 3 viên/năm Để đảm bảo không ảnh hưởng đến chức năng có con của nữ giới.

Tình huống mắc nôn dưới lúc sử dụng thuốc, cần phải xem xét thời điểm nôn sau khi sử dụng thuốc kháng sinh bao nhiêu phút. Nếu như mắc nôn

trong khoảng một giờ, nữ có nguy cơ dùng thêm một viên Nhằm giữ gìn hiệu quả tránh thai.

## **5. Khi nào đòi hỏi bắt gặp bác sĩ?**

Sau lúc sử dụng kháng sinh ngừa thai, Nếu như gặp phải bất kỳ triệu chứng nào sau đây, nữ giới nên tới Túc thì bệnh viện đa khoa Để được bác sĩ kiểm tra và giải quyết sớm. Các biểu hiện nên đặc biệt lưu ý gồm:

- Nhức đầu, hoa mắt, kém hoặc mất ngủ;
- Trống mờ mắt, giảm sút thị lực, nói chuyện khó khăn;
- Đau ngực, khó thở;
- Đau bụng nặng;
- Đau đớn nhiều tại bắp chân hay đùi.

Mặc dù là biện pháp ngừa thai hữu hiệu cho các trường hợp “cấp bách”, nhưng mà thuốc phòng tránh thai cấp bách cũng là “con dao hai lưỡi”, có khả năng gây ra nhiều hệ lụy tác động nặng nề đến tính mệnh cùng với chức năng có con của chị em. Chính Bởi vậy, nữ không nên sử dụng nhiều thuốc kháng sinh. Tham khảo ý kiến bác sĩ Nhằm được giải đáp giải pháp tránh thai hiện đại khoa học và an toàn.

Trung tâm phụ khoa hệ thống trung tâm y tế Tâm Anh tụ hội đội ngũ bác sĩ chuyên khoa phụ khoa giỏi trình độ, dày dặn kinh nghiệm sẵn sàng đi cùng Cùng với chị em trong chăm sóc tính mệnh sinh sản và ý định hóa gia đình.